

Impfabstand zwischen erster und zweiter Impfung mit Vaxzevria (=AstraZeneca)

Es wird, unter anderem auch vom Bundesgesundheitsministerium, darauf hingewiesen, dass der Abstand zwischen den beiden Impfungen mit Vaxzevria, dem Impfstoff der Firma AstraZeneca, von zwölf auf bis 4 Wochen verkürzt werden kann.

Nach derzeitigem Kenntnisstand muss aber damit gerechnet werden (vorliegende wissenschaftliche Studien zeigen dies), dass die **Wirksamkeit der Impfung gegen eine Infektion mit dem Coronavirus** geringer ist. (nach 4 Wo 55%, Nach 12 Wo > 80%)

Die **Wirksamkeit gegen einen schweren Verlauf** (Krankenhausaufnahme, Intensivstation, Tod) ist in diesen Studien auch bei längerem wie kürzerem Impfabstand nahezu komplett.

Es gibt aber auch Wissenschaftler, die den Unterschied in bisher veröffentlichten Studien für deutlich geringer halten, und welche eine **Verkürzung des Impfabstandes als weniger relevant** betrachten.

Ein abschließendes endgültiges Wissen zu diesem Thema liegt nicht vor!

Sollten Sie sich in Kenntnis dieser Daten für eine frühere Zweitimpfung entschließen, weil Ihnen die Komplettierung der Impfung sowie die daraus entstehenden Vorteile im gesellschaftlichen Leben wichtig sind, können wir in Absprache miteinander einen kürzeren Impfabstand (meines Erachtens aber nicht unter 6 Wochen) vereinbaren.

Eine gut verständliche Darstellung verschiedener wissenschaftlicher Meinungen finde Sie unter folgendem Link:

<https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/rapid-reaction/details/news/priorisierung-und-impfabstaende-der-astrazeneca-impfung/>